


ကိုဗစ်-၁၉ လူနာများတွင် အဖြစ်နည်းသော်လည်း
ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဦးနှောက်နှင့်
အာရုံကြောဆိုင်ရာ လက္ခဏာများ



စိတ်တုခြင်း




စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း



သတိလစ်ခြင်း၊
တခါတရံတက်ခြင်း



စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း



အိပ်မပျော်ခြင်း

စိတ်သောကများခြင်း
လေဖြစ်ခြင်း ဦးနှောက်ရောင်ရမ်းခြင်းကဲ့သို့သော
ရှားပါး၍ ပိုမိုပြင်းထန်သော အာရုံကြောဆိုင်ရာ
နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများ

ကိုဗစ်-၁၉ နှင့်
တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှု အခြေအနေများ

ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် တုပ်ကွေးနှစ်မျိုးလုံးတွင်
မတူညီသော ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအဆင့်များ
ရှိနိုင်သည်။


အချို့သောသူများတွင် ရောဂါလက္ခဏာမရှိပဲ၊
အချို့မှာ အပျော့စား
လက္ခဏာများ

(သို့မဟုတ်)

ပြင်းထန်သော
ရောဂါလက္ခဏာများ
ခံစားရနိုင်သည်။



ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် တုပ်ကွေး ရောဂါနှစ်မျိုးစလုံးသည်
အသက်သေဆုံးသည်အထိ ဖြစ်နိုင်သည်။



World Health
Organization
Myanmar



ကိုဗစ်-၁၉ နှင့်
တုပ်ကွေးရောဂါ
လက္ခဏာများ

ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် တုပ်ကွေး မိုင်းရပ်စ်နှစ်မျိုးလုံးတွင်
တွေ့လေ့ရှိသော တူညီသည့်လက္ခဏာများ



ဖျားခြင်း



ချောင်းဆိုးခြင်း




ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း



နှာရည်ယိုခြင်း



လည်ချောင်းနာခြင်း



ခေါင်းကိုက်ခြင်း



အရိုးဆစ်နှင့်
ကြွက်သားနာကျင်ခြင်း

အဖြစ်နည်းသော်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ လူနာအချို့တွင်
တွေ့လေ့ရှိသော အခြားရောဂါလက္ခဏာများ



ရုတ်တရက်
အနံ့ပျောက်ခြင်း၊
အရသာပျောက်ခြင်း။



နှာခေါင်းပိတ်ခြင်း။



မျက်သားအဖြူမှာ
နီလာခြင်း။



အရေပြားနီမြန်းခြင်း။



အော့အန်ခြင်း။




ဝမ်းပျက်ခြင်း။



ချမ်းတုန်ခြင်း (သို့မဟုတ်)
မူးဝေခြင်း။

ပြင်းထန်သော
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါလက္ခဏာများ

အသက်ရှူရ
ခက်ခဲခြင်း။



စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
ပြောင်းလဲမှု
ဖြစ်ခြင်း၊
စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း။



အဆက်မပြတ်
ရင်ဘတ်
အောင့်ခြင်း။



အဖျား
အလွန်ကြီးခြင်း
(၃၈ ဒီဂရီ
စင်တီဂရိတ်နှင့်
အထက်ရှိခြင်း)

