

## COVID-19 vaccine fact series




被WHO（世界卫生组织）批准在卫生局、私人及公共诊所施打接种的所有紧急使用疫苗都是安全而有效果的。

为了使COVID19疫苗能起到最高的预防效果，必须按规定中需要注射的完整疫苗剂次接种。



接种新冠COVID19疫苗，可以帮助你预防疾病，降低新冠感染患者的重症风险和需要住院治疗的风险。



大多数接种COVID19疫苗的人，并没有出现轻微的（或）严重的不良反应。




即使已接种了疫苗，但为了自己和自己的家人、朋友的安全，仍然需要遵守COVID19的防疫措施。



接种疫苗后，仍有可能感染新冠肺炎，但这种可能性非常的少。感染后疾病的症状也较相对的轻微。



疫苗对因德尔塔DELTA变异毒株和COVID19变异毒株感染而发生的重症感染和死亡有高效的预防作用。



2021年8月

大家遵守  
共同防疫



勤洗手



保持社交距离



佩戴口罩



跟踪密切接触  
接触者



单独隔离



保持通风



接种疫苗

# 被WHO（世界卫生组织） 批准在卫生局、 私人及公共诊所施打接种的所有 紧急使用疫苗都是安全而有 效果的。


世界卫生组织WHO批准于紧急使用的以下各类疫苗，都可以减轻/降低新冠肺炎感染率、住院治疗率以及疾病的死亡风险。

- Astra Zeneca / Oxford vaccine  
阿斯利康/ 牛津疫苗
- Johnson and Johnson  
强生与强生疫苗
- Moderna 莫德纳疫苗
- Pfizer / Bion Tech  
辉瑞 / 生物科技疫苗
- Sinopharm (Beijing Bio -  
Institute of Biological Products  
Co Ltd)  
国药疫苗（北京生物技术有  
限公司）
- Sinovac 科兴疫苗

“疫苗属于免费提供，有机会接种疫苗，  
请立即接种疫苗。”

2021年8月

大家遵守  
共同防疫



# 接种疫苗后， 仍有可能感染新冠肺炎， 但这种可能性非常的少。感染后 疾病的症状也较相对的轻微。


接种疫苗后感染新冠 COVID-19 疾病，是在人体内的抗体能力还没有发展到最高之前发生的。即使接种了高效的疫苗，还是有一部分人会感染新冠肺炎。不论是何种疫苗，都不可能为所有接种疫苗的人提供百分之百的预防作用。

有机会接种疫苗，  
请立即接种疫苗。



2021年8月

大家遵守  
共同防疫




# 世界卫生组织WHO批准于 紧急使用的疫苗对因

德尔塔DELTA变异毒株和COVID19变异毒株感染而发生的重症感染和死亡有高效的预防作用。

新冠COVID-19疫苗对因感染德尔塔DELTA变异毒株和出现较轻微症状的预防能力虽稍有不足，但对于重症感染以及疾病死亡的风险，却有很高的预防能力。新冠COVID-19的一些变异毒株很容易大量传播。

接种新冠COVID-19疫苗可以拯救你的生命，也可以预防新冠肺炎重症感染的发生。



2021年8月

大家遵守  
共同防疫



# 即使已接种了疫苗，但为了自己 和自己的家人、朋友的安全， 仍然需要遵守COVID19的 防范措施。

新冠COVID -19 疫苗虽然有很高的预防效力，但少部分人在接种过新冠COVID -19 疫苗后还会感染新冠肺炎。此外，也有可能传播给还没有接种过疫苗的其他人。


每个人都应该继续遵守以下防疫措施。

- 人与人之间保持社交距离；
- 外出时必须佩戴口罩；
- 常用肥皂清水洗净双手；
- 咳嗽打喷嚏时用手臂蒙住口鼻；
- 不要生活在空气不流通的处所。



2021年8月

大家遵守  
共同防疫



# 接种新冠COVID19疫苗，可以 帮助你预防疾病， 降低新冠感染患者的重症风险和需 要住院治疗的风险。

接种新冠COVID19疫苗，  
可以减少感染重症型新冠肺炎  
以及因疾病死亡的相关风险。

接种疫苗后，  
会出现头痛、发热、  
全身疼痛等较轻微的不良  
反应，但两天后症状就会自  
然消失痊愈。

接种疫苗后，  
出现严重不良反应的可能性很  
低。如有出现严重不良反应，  
需要立即告知医护人员。



2021年8月

大家遵守  
共同防疫




# 新冠COVID-19疫苗必须按规定的剂数完成接种， 才能产生最高的预防效果。

即使已按规定的新冠COVID-19疫苗剂数完成接种，在数周内，仍不能产生最高的预防效果。

“

也就是说：  
如果按规定接种两剂新冠COVID-19疫苗，那么在接种第二剂疫苗後的2~3周内，仍然不能产生足够的预防能力。

”




2021年8月


大家遵守  
共同防疫



勤洗手

保持社交  
距离

佩戴口罩

跟踪密切  
接触者

单独隔离



保持通风

接种  
疫苗

# 大多数接种COVID19 疫苗的人，

并没有出现轻微的（或）严重的  
不良反应。

截止2021年5月，全球各地已经安全接种13亿5千万（13,500,000,000）剂新冠COVID-19疫苗。

接种疫苗后，一般出现的不良反应是头痛、发热和全身疼痛等症状，这些症状在两天内就会自然消失痊愈。接种疫苗后如果感到任何担忧时，立即告知医护人员（医生）。

2021年8月

大家遵守  
共同防疫

